

Załącznik do zezwolenia MRiRW
Nr R- **35** /2009i.r. z dnia **14.12.** 2009 r.

Producent:

HERMOO Belgium N.V., Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii;
Tel.: +32 11 88 03 66, fax: +32 11 70 74 84;

Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Królestwa Belgii:

HUNTJENS B.V., Veilingweg 23, 6247 EP Gronsveld, Królestwo Niderlandów;
Tel.: +31 43 408 3663, fax: +31 43 408 1665;

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-AZOT” S.A., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno;
Tel./fax: (032) 616 40 73, (032) 616 24 17, www.azot.pl, email: handlowy@azot.pl


*Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska*

SAMITRON EXTRA 70 WG

Zawartość substancji aktywnej:

metamitron: 4-amino-6-fenyl-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on/ (związek z grupy triazynonów) –
70%.

Zezwolenie MRiRW Nr R- **35** /2009i.r. z dnia **14.12.** 2009 r.



Niebezpieczny dla środowiska

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



UWAGA!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.**

I. OPIS DZIAŁANIA

SAMITRON EXTRA 70 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych i wiechliny rocznej w buraku cukrowym, buraku pastewnym, truskawce.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żóltlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity.

Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY

W celu ekonomicznego i bardziej skutecznego zwalczania chwastów można stosować środek w dawkach dzielonych według podanych poniżej schematów z uwzględnieniem innych herbicydów. Dawki dzielone są przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku.

a) zabiegi nalistne:

Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni:

pierwszy zabieg:

Samitron Extra 70 WG **2 kg/ha**.

drugi zabieg - w 5-10 dni po pierwszym zabiegu:

Samitron Extra 70 WG **2 kg/ha**.

trzeci zabieg - w 5-10 dni po drugim zabiegu (w razie potrzeby)

Samitron Extra 70 WG **2 kg/ha**.

b) w fazie 3-5 liści buraka środek można stosować łącznie ze środkiem Lenazar 80 WP

Samitron Extra 70 WG **3,5 kg/ha** + Lenazar 80 WP **0,5 kg/ha**.

W przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych można zastosować środek jednorazowo w fazie 3-5 liści buraka.

Zalecana dawka: **5 kg/ha**.

W celu obniżenia dawki środka Samitron Extra 70 WG bez zmniejszenia skuteczności jego działania środek można stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC.

Samitron Extra 70 WG **4 kg/ha** + Atpolan 80 EC **1,5 l/ha**.

2. TRUSKAWKA

Plantacje nowo założone opryskiwać po wytworzeniu przez rośliny truskawek korzeni przybyszowych.

Zalecana dawka: **3-4 kg/ha**.

W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Samitron Extra 70 WG można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Lenazar 80 WP:

Samitron Extra 70 WG **2-2,5 kg/ha** + Lenazar 80 WP **0,5-0,75 kg/ha**.

Plantacje owocujące (od drugiego roku po posadzeniu) opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji.

Zalecana dawka: **4-5 kg/ha**.

W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Samitron Extra 70 WG można stosować w tym samym terminie w mieszaninie ze środkiem Lenazar 80 WP.

Samitron Extra 70 WG **2-3 kg/ha** + Lenazar 80 WP **1,5 kg/ha**.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

III. PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować powschodowo:

- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w okresie spodziewanych przymrozków.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV. NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki, seradelę oraz łubin.

Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji buraków po zastosowaniu mieszanin środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę uprawianą następczo.

V. OKRES KARENCJI

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY, TRUSKAWKA - NIE DOTYCZY.

VI. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ

Okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY.

VII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Podczas sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny ze środkiem Lenazar 80 WP, najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Samitron Extra 70 WG, a następnie do sporządzonej cieczy dodać Lenazar 80 WP rozprowadzony w małej ilości wody.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm. Nie zaleca się wykonywania zabiegów w temperaturze powietrza bądź przy gruncie powyżej 25°C.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, cieplej pogody, na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VIII. PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

IX. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

X. ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

XI. POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk -	(0-58) 682-04-04	Rzeszów -	(0-17) 866-40-25
Kraków -	(0-12) 411-99-99	Sosnowiec -	(0-32) 266-11-45
Lublin -	(0-81) 740-89-83	Tarnów -	(0-14) 631-54-09
Łódź -	(0-42) 657-99-00	Warszawa -	(0-22) 619-66-54
Poznań -	(0-61) 847-69-46	Wrocław -	(0-71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -